

Erigeron du Canada

Vergerette du Canada, Vergerolle du Canada, Herbe aux Français...

Conyza canadensis

Code EPPO: ERICA

| Famille | Astéracées | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|
| Type | <input checked="" type="radio"/> Annuelle | <input type="radio"/> Bisannuelle | <input type="radio"/> Pluriannuelle | <input type="radio"/> Vivace |
| Période de germination | <input checked="" type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> F <input checked="" type="radio"/> M | <input checked="" type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> M <input checked="" type="radio"/> J | <input checked="" type="radio"/> J <input checked="" type="radio"/> A <input checked="" type="radio"/> S | <input checked="" type="radio"/> O <input checked="" type="radio"/> N <input checked="" type="radio"/> D |
| Type de sol préférentiel | Tous types de sols, préférence sols secs/pierreux et limono-sableux | | | |
| Cultures préférentielles | Toutes cultures | | | |
| Résistance identifiée en FR | <input checked="" type="radio"/> Oui | <input type="radio"/> Non | | |
| Nuisibilité | <input checked="" type="radio"/> Forte | <input type="radio"/> Moyenne | <input type="radio"/> Faible | <input type="radio"/> Inconnue |
| Toxicité | <input type="radio"/> Forte | <input type="radio"/> Moyenne | <input checked="" type="radio"/> Faible | <input type="radio"/> Inconnue |
| Confusion possible | Erigeron de Sumatra, Erigeron de Buenos Aires | | | |

ORIGINE ET DISTRIBUTION


L'érigéron du Canada fait partie de la famille des astéracées. Originnaire du continent américain, elle a été signalée début XX^{ème} dans les Pyrénées orientales.

Cette adventice est dite « anémophile », les graines sont disséminées par le vent. Rudérale (friches, jachères), elle sait aussi être messicole.

Elle est souvent confondue avec l'érigéron de Sumatra (pilosité foliaire plus abondante, pétiole court et foliacé).

DESCRIPTION

- 1 Les cotylédons sont très petits, fugaces et avec un pétiole très court.
- 2 Les premières feuilles sont globalement entières et pétiolées. Elles sont disposées en petites rosettes de 2 cm maximum. Les feuilles suivantes sont lancéolées et dentées. La tige est dressée, très ligneuse et peut atteindre 2m de haut.
- 3 La floraison intervient de juillet à septembre. Les fleurs sont blanches jaunâtres et réunies en capitules.



+ CLIN D'OEIL

En France, il existe des populations d'Erigeron résistantes aux herbicides, notamment le glyphosate (cas identifié en 2009 dans le sud-est).