





LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU



Types de sols des parcelles du réseau ObsHerb



41 parcelles sur 5 départements

(31, 32, 47, 81, 82)



Types de sols variés, à majorité argilo-calcaire



Dés herbée à l'automne Non dés herbée à l'automne

QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?

Pourcentage de dicots retrouvés dans les parcelles



À RETENIR

Aurélié FALTOT – Responsable Technique - 06 83132497



Seulement 22% des parcelles du Réseau ont été dés herbées à l'automne.

Sur ces parcelles, 1/3 présentent des dicots avec notamment du chardon des champs et chardon marie.

La majorité des parcelles n'ayant pas pu être des herbée à l'automne au vu des conditions très pluvieuses, nous observons une diversité importante de dicots.

Nous retrouvons les dicots classiques de la région : véronique, matricaire, coquelicot, séneçon et chardons des champs. A noter la présence de gaillet à des stades développés (+6F) qui nécessite de s'orienter vers des spécialités anti-dicots à large spectre pour les rattrapages de sortie d'hiver.



CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.
				T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires		> 0°C < 25°C		> 0°C	Sélectivité	Sélectivité	Efficacité	Efficacité Sél ⁽¹⁾
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C		> 5°C	Sélectivité	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures ⁽²⁾
Hormones		> 10 à 12 < 25°C		> 10°C	Eff/Sél	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures ⁽²⁾
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C		> 5°C	Eff/Sél	Sélectivité	Efficacité	Si > 1 à 6 heures ⁽²⁾

Sél : Sélectivité
Eff : Efficacité

¹Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations

²Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

Pas d'effets Effets moyennement défavorables
 Effets défavorables Effets favorables

BOTA'CLUB : HELMINTHIE VS PICRIS



Limbe large et pustuleux



Limbe lancéolé non pustuleux

Le coup de pouce



FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices

