

Bulletin OBSHERB #3 Centre

A RETENIR


60% des parcelles désherbées à l'automne présentent un salissement (rappel 23% fin-février), avec principalement des chardons, des renouées et de l'anthesisque.

La succession des épisodes gélifs avec ceux pluvieux et doux ont été **favorables à la levée** de nombreuses adventices.

Dans les parcelles désherbées à l'automne, il est **trop tôt pour intervenir** dans la plupart des situations.

LA FLORE DU RÉSEAU OBS'HERB

Flore présente en % citation



Situations désherbées à l'automne

La flore **se diversifie** avec la levée de renouée des oiseaux, renouée liseron, anthesisque, gaillet. La plupart sont à cotylédons avec des pressions inférieures 5 plantes/m². **Les levées sont en cours.**


Le chardon reste l'adventice majoritaire et **poursuit sa dynamique de levée**. Pour rappel, l'optimum d'intervention se situe souvent entre 3 Nœuds et Dernière Feuille Etalée.

Situations NON désherbées à l'automne

Les levées ralentissent et les adventices se développent.

Rappel des bonnes conditions d'utilisation des anti-cotylédons: hygrométrie > 60%, attention au température minimum selon le produit utilisé, éviter les amplitudes thermiques >13°C au moment de l'application et dans les 4 jours suivants l'intervention

Flore présente en % citation



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

