

BULLETIN OBSHERB

#2 - Normandie (76 & 27) - 7 mars 2022

A RETENIR




Jérémie Soirant
CRC Nord

Nouvelles levées : Matricaire sp, Arabette de thalius, Capselle bp, Cardamine hirsute, Chrysanthème des moissons, Renouée liseron et Chardon.

- **31 % des parcelles désherbées à l'automne présentent déjà un salissement.**
- **Premières levées de chardons** observées hors réseau dans de nombreuses parcelles. Pour rappel, en 2021 les premières levées ont été observées à partir du 15 mars.

LA FLORE DU RÉSEAU OBSHERB



Situations désherbées à l'automne

Des levées de **Matricaire, Arabette, Capselle, Cardamine, Renouée liseron et Chardon** sont observées depuis le dernier bulletin.


Le stade des adventices est variable : dans l'ensemble à cotylédons ou premières feuilles, et + de 6 feuilles pour les gaillet gratteron et cardamine hirsute recensés dans le 27.

Situations NON désherbées à l'automne

Evolution et levées moins rapides, certainement car il s'agit des parcelles semées plus tard.

Depuis le dernier bulletin : levées de **Chrysanthème des moissons.**

Les adventices sont majoritairement au stade cotylédons à premières feuilles.



- Matricaire sp
- Véronique de perse
- Chrysanthème des moissons
- Sanve

BULLETIN OBSHERB

#2 - Normandie (76 & 27) - 7 mars 2022

BOTA'CLUB : NUISIBILITÉ DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

| | | | |
|--------------|------|--------------------|-------|
| Gaillet | 1.8 | Véronique de Perse | 26.0 |
| Folle avoine | 5.3 | Véronique F de L | 44.0 |
| Coquelicot | 22.0 | Lamier | 44.0 |
| Matricaire | 22.0 | Myosotis | 66.0 |
| Ray-Grass | 25.0 | Pensée | 133.0 |
| Vulpin | 26.0 | Alchémille | 133.0 |
| Stellaire | 26.0 | | |

BOTA'CLUB : VÉRONIQUE À FEUILLES DE LIERRE | VÉRONIQUE DE PERSE

Véronique à feuilles de lierre

Cotylédons

Grands, ovales, à sommet arrondi, pétiolés et non échancrés.



Feuilles

Limbe de la première paire de feuilles présente 3 lobes marqués. Les suivantes sont divisées en 3 à 5 lobes.



Véronique de Perse

Cotylédons

Taille moyenne, forme triangulaire-arrondie, pétiolés et légèrement tronqués au sommet.



Feuilles

Premières feuilles opposées, les suivantes alternes. Feuilles ovales larges à grosses dents : entre 5 à 9 dents pour les feuilles adultes.



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

