

# ObsHerb #3 – Région Bretagne

03 avril 2023


## ETAT DES LIEUX DES PARCELLES BRETONNES DÉBUT AVRIL

75 % des parcelles du réseau avec présence d'adventices début avril


45 % des parcelles du réseau avec des vivaces début avril

## EVOLUTION DES DICOTS PRÉSENTES DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU

% de parcelles avec adventices



% de parcelles avec vivaces



- **augmentation** du nombre de parcelles avec du séneçon et de la véronique de perse
- % de parcelles avec gaillet, matricaire et fumeterre **stable**
- **Levées de renouées dans plus de 20% des parcelles**

**Augmentation** du nombre de parcelles avec du rumex et/ou du chardon des champs

## A RETENIR



N. Scipion  
RTM Ouest

En ce début avril, 75% des parcelles montrent la présence de dicots dont 40% de ces parcelles avec vivaces (rumex et/ou chardons des champs).

- Augmentation du séneçon : +17%
- Augmentation de la véronique de perse : + 7%
- Augmentation plus limitée de la fumeterre et des matricaires : + 1%
- Augmentation forte des levées de renouées : +22%

# ObsHerb #3 – Région Bretagne

03 avril 2023

## EXPERTISES DESHERBAGE FMC

### Quel stade optimum pour positionner les anti-vivaces ?

RUMEX SP



- > 10 à 20 cm de haut
- > Avant hampe florale

CHARDON DES CHAMPS



- > 10 à 15 cm
- > Avant boutons étoilés

LYCHNIS DIOIQUE



- > 10 à 20 cm
- > Avant appareil floral

## BOTA'CLUB : CHARDON DES CHAMPS

Famille	Astéracées											
Type	<input type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input checked="" type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> S	<input type="radio"/> O	<input type="radio"/> N	<input type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Nulle	<input checked="" type="radio"/> Inconnue								
Confusion	Autres <i>Cirsium</i> , <i>Cardus</i> et laiterons											



Evalio® FlashFlore  
Outil de reconnaissance  
des adventices



Evalio® HerbiXpert  
La bonne dose, au bon moment,  
sur la bonne cible



# ObsHerb #3 – Région Bretagne

03 avril 2023

## POURQUOI DÉSHERBER AVEC OMNERA/PROVALIA/AVALETTA® LQM®

🌿 Toutes céréales ( sauf épeautre)

🌡️ Efficace dès 10°C

➕ Large spectre d'activité


🎯 Formulation LQM® optimisée

🌿 Compatible avec de nombreux herbicides et fongicides  
**Nous consulter**

### CONDITIONS D'EMPLOI

- ✓ Bien agiter avant emploi
- ✓ **Ne pas appliquer si des amplitudes thermiques (> 13°C) sont susceptibles de persister après le traitement**
- ✓ **Ne pas appliquer sur une culture souffrant de stress**
- ✓ **Température > 5°C au moment du traitement et dans les 4 jours suivants ( T°C comprises entre 5°C et 25°C)**

### LARGE SPECTRE ANTI-DICOTS



**Sortie d'hiver**  
(BBCH 20-32)

**Tardif**  
(BBCH 37-39)

Synthèse 2012 2014 – 55 essais  
T BBCH 20 à BBCH31 - Printemps  
Observations à T + 60 jours environ



**ATTENTION**

Avaletta/Omnra/Provalia® LQM® : Suspension concentrée huileuse (OD) à base de 5 g/L (0,51%p/p) de metsulfuron-méthyle + 30g/L (3,03%p/p) de thifensulfuron-méthyle + 194,5 g/L (19,66%p/p) de fluroxypyr-méptyl (équivalent à 135g/L (13,65%p/p) de fluroxypyr acide). AMM n° 2160920. H317-Peut provoquer une allergie cutanée. H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH066 – L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. EUH401 – Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Avaletta et LQM sont des marques déposées de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales. Homologué et distribué par FMC France - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - France - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - [www.fmcagro.fr](http://www.fmcagro.fr) Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**