


ObsHerb #3

16 Mars 2022


ÉTAT DE L'OBSERVATION DES DICOTYLÉDONES DANS LE RÉSEAU (30 SITUATIONS DISPONIBLES)



DICOTYLÉDONES PRÉSENTES APRÈS UN DÉSHERBAGE D'AUTOMNE

Nouvelle levée

Pourcentage de dicots retrouvées dans les parcelles desherbées à l'automne




La flore se diversifie.
Le chardon des champs reste l'adventice majoritaire et poursuit sa dynamique de levée.

ObsHerb #3

16 Mars 2022


DICOTS PRÉSENTES DANS LES PARCELLES NON DÉSHERBÉES À L'AUTOMNE



Les levées ralentissent et les dicots se développent

Pourcentage de dicots retrouvées dans les parcelles

RAPPEL : BONNES CONDITIONS D'UTILISATION



- ✓ Hygrométrie > 60%,
- ✓ Attention à la température minimum selon le produit utilisé,
- ✓ Eviter les amplitudes thermiques >13°C au moment de l'application et dans les 4 jours suivants l'intervention
- ✓ Adapter la dose au stade de développement des dicots

À RETENIR



Aurélie FALTOT

RTM Sud / 06 83 13 24 97

- **Dans les parcelles traitées à l'automne**, de nouvelles dicots apparaissent (Mouron, carotte, géranium, ammi majus). Un rattrapage sera à envisager ultérieurement pour gérer les chardons des champs, gaillet et ombellifère qui passent à travers les programmes d'automne.
- **Pour les parcelles non désherbées à l'automne**, pas de nouvelles levées mais des **dicots développées et très diversifiées** en fonction des parcelles. Il est temps d'intervenir dès que les conditions météo seront favorables avec des spécialités à large spectre type sulfonylurées.