

# Vendetta®/Trabant®

Fongicide pomme de terre



LA SYNERGIE DE DEUX MOLÉCULES POUR UNE MAÎTRISE DURABLE DES MALADIES DE LA POMME DE TERRE


## MAÎTRISER DURABLEMENT MILDIOU & ALTERNARIOSE

Vendetta®/Trabant®, une association unique à base de Fluazinam et d'Azoxyastrobine pour permettre :

- Une efficacité mildiou renforcée grâce à la synergie des modes d'action même sur souches de moindre sensibilité au fluazinam.
- Une association de modes d'action pour préserver la durabilité des solutions disponibles.
- Une solution efficace, au niveau des standards, sur alternariose.

## POSITIONNEMENT

- Appliquer le produit en préventif
- Privilégier les applications au stade végétation stabilisée
- Dose : 0,5 L/ha
- Nombre d'applications : 3 maxi
- Délai à la pluie : 1 h (renouveler après 40 mm)
- Recommandation Arvalis pour encadrer l'utilisation du Fluazinam : En période de végétation stabilisée pas plus de deux applications non consécutives et uniquement associé à un autre MOA (Vendetta®/Trabant®)



Vendetta®/Trabant® : Suspension concentrée [SC] contenant 375 g/L (30 % p/p) de fluazinam et 150 g/L (12 % p/p) d'azoxystrobine. AMM n° 2160764. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou [www.phytodata.com](http://www.phytodata.com). Vendetta et Trabant sont des marques déposées de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales. Homologué et distribué par FMC France - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - France - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - [www.fmcagro.fr](http://www.fmcagro.fr). Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation. Crédits photos : Shutterstock - Novembre 2023



ATTENTION - H317-Peut provoquer une allergie cutanée. H361d-Susceptible de nuire au fœtus. H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208-Contient de la 1,2-benzisothiazol-3(2H)-one. Peut produire une réaction allergique. EUH401-Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

**PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.**

# Vendetta®/Trabant®

Fongicide pomme de terre



## EFFICACITÉ MILDIOU EN VÉGÉTATION STABILISÉE

Essai mildiou en végétation stabilisée - Forte pression mildiou Fredon HDF/FMC -2021

Contamination souches EU13-EU36-EU37 A2 le 8/06  
6 applications du 28/06 au 3/08 (7 jours entre les applications)



Témoïn

Fluazinam solo  
0,4 l/ha

Vendetta®/Trabant®  
0,5 l/ha


Alternance  
Vendetta®/Trabant®  
0,5 l/ha avec un  
contact élaboré

- 1 **SYNERGIE D'ACTION**  
du fluazinam et de l'azoxystrobine sur mildiou
- 2 **EFFICACITÉ RENFORCÉE**  
par rapport au fluazinam solo
- 3 **DURABILITÉ DES PROGRAMMES**  
de protection

## UN HAUT NIVEAU D'EFFICACITÉ SUR ALTERNARIOSE

Evolution de l'intensité d'alternariose sur feuilles

(cv Bintje, Essais +, 2018)



## FICHE D'IDENTITÉ

N° AMM	2160764	Nbre d'application	3 maxi
Composition	375 g/l (30 % p/p) Fluazinam + 150 g/l (12 % p/p) Azoxystrobine	Classement	H317 - H361d - H410
Formulation	SC (Suspension Concentrée)	Stade d'application	BBCH 20-95
Usages et doses	Pomme de terre*TPA*mildiou Pomme de terre*TPA*maladies des taches brunes	DRE	48 heures
		DAR	7 jours