ObsHerb

31 mars 2025

Région 02-08-10-51-55-77 #2

ETAT DE L'OBSERVATION DES DICOTYLÉDONES DANS LE RÉSEAU

58 % des parcelles du réseau avec présence de dicots ou vivaces cette semaine.

Avez-vous observé des dicots' ou vivaces ?



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



À RETENIR

Charlotte BREMARD– RTM - 06 08 40 84 01

La présence de dicots' et vivaces s'accentue avec **58% des parcelles** du réseau concernées. La flore se diversifie avec l'apparition de dicots' printanières.

Nos gammes SX® ou LQM® sont des solutions à large spectre tout à fait adaptées aux flores diversifiées. **Le suivi de la dynamique de levée des chardons des champs est en place. Cependant, il est encore trop tôt pour cibler cette adventice.**

©FMC Corporation – Mars 2025

ObsHerb

31 mars 2025

Région 02-08-10-51-55-77 #2

FMC An Agricultural Sciences Company

OUI, APRÈS UN BLÉ TRAITÉ SX®/LQM®, JE PEUX IMPLANTER UN COLZA !

Reste-t-il de la matière active dans le sol ?

Dépendant de l'interception par la culture traitée

Plus la culture couvre le sol, moins le produit arrive au sol.

Seuil d'interception théorique d'une céréale :
BBCH 30: 70%
BBCH 39-40: 90%

Dépendant de la vitesse de dégradation de la molécule dans le sol

2 mécanismes principaux de dégradation :

HYDROLYSE

DÉGRADATION MICROBIENNE

La **durée de 1/2 vie** du metsulfuron est de 7 à 37 jours (13,3 en moyenne) au champ

source dossier AMM Metsulfuron-methyl (Ref: DPX T6376) (herts.ac.uk))

Définition de la sensibilité de la culture suivante

La dose de matière active sans effet peut être déterminée au laboratoire et confirmée au champ

158

C'est le nombre d'essais "colza en cultures suivantes" menés par FMC depuis 1983

2 millions

C'est le nombre d'hectares estimé de céréales désherbées avec les antidicots FMC chaque année

Le **seuil de sensibilité du colza** (EC10) au metsulfuron est de l'ordre de **0,2 g m.a./ha** lorsqu'il est incorporé dans le sol

1 application de sulfonylurées anti-dicotylédones SX®/LQM®
sur des céréales en bon état végétatif

Aucun impact sur l'implantation d'une culture de colza ou de couverts
(gesse, tournesol, vesce, fénugrec, sorgho)

©FMC Corporation – 2025

Le coup de pouce

FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices

Télécharger dans l'App Store

Disponible sur Google Play