





### **LE RESAU REGIONAL EN 2025**





43
Parcelles
suivies




86% des parcelles du réseau ont été désherbées à l'automne



## QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU?

Pourcentage de dicots retrouvées dans les parcelles (avec et sans désherbage d'automne)





Stéphanie Delaplace - RTM Nord - 06 30 92 90 28

Malgré un pourcentage élevé de parcelles désherbées à l'automne nous retrouvons une grande diversité de dicotylédones présentes dans les parcelles : Matricaire Sp., Veronique de perse, Gaillet gratteron, Chardon des champs, Sénéçon Commun, ....

La gestion des matricaires doit se faire de manière différenciée et anticipée de celle des chardons des champs, la bonne efficacité de nos solutions étant conditionnée aux stades jeunes des adventices.






# **BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®**

## **BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®**

- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

#### SX® complètement soluble dans l'eau :







#### **BOTA'CLUB: NUISIBILITE DES ADVENTICES**

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8
Folle avoine	5.3
Coquelicot	22.0
Matricaire	22.0
Ray-Grass	25.0
Vulpin	26.0
Stellaire	26.0

Véronique de Perse	26.0
Véronique F de L	44.0
Lamier	44.0
Myosotis	66.0
Pensée	133.0
Alchémille	133.0





FlashFlore

Outil de reconnaissance des adventices

