




OBSERVATION DES DICOTYLEDONES DANS LE RESEAU REGIONAL 2025

% parcelles désherbées cet automne




Le réseau regroupe les départements 02, 08, 10, 51, 55 et 77 soit 37 parcelles suivies.


Sur la région, 89% des parcelles ont été désherbées à l'automne, soit 33 parcelles.

La majorité des interventions de prélevée sont à base d'un produit contenant du flufénacet.

Nombre de parcelles selon la stratégie de désherbage



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



À RETENIR

Charlotte BREMARD - RTM - 06 08 40 84 01



Le taux de désherbage d'automne régional est largement supérieur à celui du réseau national où seulement 68% des parcelles ont été désherbées cet automne. Le réseau présente une diversité de flore. Des adventices sont observées sur 38 % des parcelles du réseau, dont 71% de ces parcelles ont été désherbées cet automne (*matricaire et véronique FDL principalement observées*). Il s'agit donc ici des situations où les herbicides employés commencent à révéler les « trous » d'efficacités...




BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®


- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau :



BOTA'CLUB : L'ANTHRISQUE COMMUN

Famille	Apiacées											
Type	Annuelle			Bisannuelle			Pluriannuelle			Vivace		
Période de germination	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
Résistance en FR	Oui			Non								
Nuisibilité	Forte			Moyenne			Faible			Inconnue		
Toxicité	Forte			Moyenne			Faible			Inconnue		
Confusion	Autres apiacées et fumeterres											



©FMC Corporation – Février 2025

Le coup de pouce



FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices

