





QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



62% des parcelles du réseau avec des dicots' ou des vivaces



FOCUS CHARDONS : DYNAMIQUE DE LEVÉE



À RETENIR

Stéphanie Delaplace – RTM Nord – 06 30 92 90 28

62% des parcelles du réseau **présentent des dicots' ou des vivaces et vont nécessiter un rattrapage de printemps.** Nous retrouvons une grande diversité de flore : chardons des champs, matricaire sp., gaillet gratteron, renouées liseron, séneçon commun, ...

Cependant la levée des chardons continue. Il est nécessaire d'attendre la levée complète pour **maximiser l'efficacité du traitement.** Cette levée se stabilise en général **entre les stades 2 nœuds et DFP des céréales d'hiver.**



STADE OPTIMUM POUR GÉRER LES VIVACES

RUMEX SP



- > 10 à 20 cm de haut
- > Avant hampe florale

CHARDON DES CHAMPS



- > 10 à 15 cm
- > Avant boutons étoilés

LYCHNIS DIOIQUE



- > 10 à 20 cm
- > Avant appareil floral



BOTA'CLUB : NUISIBILITE DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		

Le coup de pouce



FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices

