




LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU





Pourcentage de parcelle désherbées à l'automne



39 parcelles sur 7 départements
(59,62,02,60,80,76,27)
81,25% des parcelles ont été désherbées à l'automne sur le secteur alors que le niveau national est à 54,41%

QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



À RETENIR

Stéphanie Delaplace – RTM Nord - 06 30 92 90 28



Malgré un **pourcentage élevé de parcelles désherbées à l'automne** sur la région nous retrouvons une **grande diversité de dicotylédones** présentes dans les parcelles. On retrouve notamment : des **chardons de champs**, des **matricaires**, des **gaillets**, des **séneçons** et des **repousses de colza**. **La gestion des matricaires doit se faire de manière différenciée de celle des chardons des champs**. En effet, si l'on attend les interventions chardons pour gérer les matricaires, celles-ci seront trop développées et les efficacités seront moins bonnes.


Les chardons des champs, eux, continuent de lever !



GESTION DES ANTHRISQUES COMMUNS

Positionnement Sulfonylurées SX® sur anthrisques

Essai FMC 2022 - 840 anthrisques/m²
% efficacité 01/06/2022 (T4+45 jours)



L'ensemble de la gamme Sulfonylurée FMC est efficace sur anthriscus cependant quelques points de vigilance sont à prendre en compte :

- Attention aux levées échelonnées
- Le stade des anthrisques sera essentiel, stade optimum <8F

Equivalence technique SX® sur anthrisques

- Biplay® SX® 45 g
- Pragma® SX® 75 g
- Pointer® Ultra SX® 35 g


Optimiser mon traitement :

- ✓ Traiter en sortie hiver en conditions poussantes à dose homologuée
- ✓ Optimum février – mars en fonction des levées
- ✓ Intérêt d'adjuvanter en conditions difficiles (hygrométrie faible et forte pression).



BOTA'CLUB : L'ANTHRISQUE COMMUN

Famille	Apiacées											
Type	<input checked="" type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input checked="" type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> S	<input checked="" type="radio"/> O	<input checked="" type="radio"/> N	<input type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input checked="" type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Confusion	Autres apiacées et fumeterres											



© FMC Corporation – Mars 2024

Le coup de pouce



FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices






BÉNÉFICES DE LA FORMULATIONS SX®

BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau :



Pragma® SX® : Granulé soluble dans l'eau [SG] contenant 333 g/kg (33,3 % p/p) de thifensulfuron-méthyle et 167 g/kg (16,7 % p/p) de tribénuron-méthyle. AMM n° 2100009. Pragma et SX sont des marques déposées de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales.

Biplay® SX® : Granulé soluble dans l'eau [SG] contenant 111 g/kg (11,1 % p/p) de metsulfuron-méthyle et 222 g/kg (22,2 % p/p) de tribénuron-méthyle. AMM n° 2090057. Allié et SX sont des marques déposées de FMC Corporation et/ou de l'une de ses filiales.

Pointer® Ultra SX® : Granulé soluble dans l'eau [SG] à base de 143 g/kg (14,3 % p/p) de tribénuron-méthyle et 143 g/kg (14,3 % p/p) de metsulfuron-méthyle. AMM n° 2090054. Homologué et distribué par FMC France - 11 bis, Quai Perrache - F-69002 Lyon - Tél. +33 (0)4.37.23.65.70 - RCS Lyon B 352 320 279 - www.fmcagro.fr. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>. Pour les usages autorisés, doses, conditions et précautions d'emploi, restrictions et contre-indications, se référer à l'étiquette du produit et/ou www.phytodata.com. Dangereux. Respecter les conditions d'emploi. Lire attentivement l'étiquette avant toute utilisation.



ATTENTION - H373 - Risque présumé d'effets graves pour les organes à la suite d'expositions répétées ou d'une exposition prolongée. H410 - Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. EUH208 - Contient du tribénuron-méthyle. Peut produire une réaction allergique. EUH401 - Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.