



13 février 2026

Région Bretagne, Basse Normandie et Nord des Pays de Loire #1







LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU



20 parcelles sur 9 départements
(Types de sols variés, à majorité argilo-limoneux)





En moyenne, 70% des parcelles reçu un traitement d'automne avec un gradient Est/Ouest
83% sur le nord des pays de Loire/ 67% en basse Normandie et 50% en Bretagne



3 molécules principales dans les programmes d'automne; Le DFF, le Prosulfocarbe et le Flufénacet



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



À RETENIR


Nicolas SCIPION – RTM - 06 89 88 12 57



Pour ce premier bulletin Nord Loire, la majorité des parcelles ont été désherbées à l'automne. Les programmes d'automne ont cependant laissé passer des séneçons, des gaillets et de la fumeterre. A noter que les parcelles non désherbées montrent une majorité de véroniques de perse ainsi que du gaillet, de la stellaire et de la matricaire. (stades entre cotylédons et 6 feuilles) Les vivaces pointent déjà avec la présence de chardons et de rumex.



CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.	
				Stade des adventices <3fe. pl. dév.	T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires	< 19 km/h	> 0°C < 25°C	> 60%		> 0°C				
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C			> 5°C				
Hormones		> 10 à 12 < 25°C			> 10°C				
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C			> 5°C				

Sél : Sélectivité

Eff : Efficacité

¹Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations²Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation

Pas d'effets

Effets défavorables



Effets moyennement défavorables

Effets favorables



BOTA'CLUB : VÉRONIQUE FEUILLE DE LIERRE | VÉRONIQUE DE PERSE

Véronique à feuilles de lierre

Cotylédons

Grands, ovales, à sommet arrondi, pétiolés et non échancrés.



Feuilles

Limbe de la première paire de feuilles présente 3 lobes marqués. Les suivantes sont divisées en 3 à 5 lobes.



Véronique de Perse

Cotylédons

Taille moyenne, forme triangulaire-arrondie, pétiolés et légèrement tronqués au sommet.



Feuilles

Premières feuilles opposées, les suivantes alternes. Feuilles ovales larges à grosses dents : entre 5 à 9 dents pour les feuilles adultes.



Le coup de pouce



FlashFlore

Outil de reconnaissance des adventices





ObsHerb

Plus de 270 parcelles en France

FMC

An Agricultural
Sciences Company



UN RÉSEAU ANCRÉ ET DYNAMIQUE

Réseau d'observation de la dynamique de levée des adventices



1 relevé
par semaine
sur 8 semaines



+270
Parcelles en
France

Bulletins
régionaux
tous les 15
jours



49
départements
couverts



Céréales
d'hiver

Graminées,
dicotylédones
+ focus
chardon

8

rédacteurs FMC

Vos bulletins régionaux contiendront les rubriques ci-dessous, axées sur le partage d'informations de levées des adventices ainsi que l'expertise FMC en désherbage des céréales et malherbologie :



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



A RETENIR



EXPERTISE DÉSHERBAGE FMC



EXPERTISE MALHERBOLOGIE FMC



INFORMATIONS SOLUTIONS FMC

Le coup
de pouce 



FlashFlore

Outil de reconnaissance
des adventices

Télécharger dans
l'App Store

ESCIEN DESIR
Google Play