



ObsHerb

Plus de 300 parcelles en France



An Agricultural
Sciences Company



UN RÉSEAU ANCRÉ ET DYNAMIQUE

Réseau d'observation de la dynamique de levée des dicotylédones



1 relevé
par semaine
sur 8 semaines



+300
Parcelles en
France

Bulletins
régionaux
tous les 15
jours



49
départements
couverts



Céréales
d'hiver

Focus
Dicotylédones

8
rédacteurs FMC

Vos bulletins régionaux contiendront les rubriques ci-dessous, axées sur le partage d'informations de levées des adventices ainsi que l'expertise FMC en désherbage des céréales et malherbologie :



QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



A RETENIR



EXPERTISE DÉSHERBAGE FMC



EXPERTISE MALHERBOLOGIE FMC



INFORMATIONS SOLUTIONS FMC

Le coup
de pouce



FlashFlore

Outil de reconnaissance
des adventices






9 février 2026


Régions BFC & Lorraine #1




LOCALISATION DES PARCELLES SUIVIES DANS LE RÉSEAU



Types de sol des parcelles du réseau ObsHerb



Techniques culturales des parcelles du réseau ObsHerb



32 parcelles sur les 2 régions

Types de sols variés, à majorité argilo-calcaire
Travail superficiel du sol majoritaire

70% de parcelles désherbées automne...


...dont + de 8 agriculteurs sur 10 qui désherbent utilisant le flufénacet
...et 5 agriculteurs sur 10 qui désherbent utilisant le prosulfocarbe

©FMC Corporation – Février 2026

Désherbée à l'automne
 Non désherbée à l'automne



FOCUS DICOTYLEDONES OBSERVÉES DANS LE RÉSEAU



Un premier constat en cette mi-février...

57% du réseau observe des dicotylédones dans le blé (43% n'en observe pas pour le moment) ...

.... qu'il y ait eu ou non intervention de désherbage à l'automne 2025.

Ce taux de présence de dicotylédones sera surveillé au cours des semaines à venir.

Gaillet gratteron, Matricaires et Véroniques dominent dans les 1ères observations. Les levées de chardons des champs seront également suivies de près ces prochaines semaines.



À RETENIR

François COCHET – Resp. tech. de région - 06 89 18 96 82



70% des parcelles du Réseau ont été **désherbées à l'automne**, un chiffre dans la tendance nationale. Les produits à base de flufénacet restent les plus plébiscités par les agriculteurs de la région, utilisés autant en pré qu'en post-levée.

A signaler la présence de graminées sur 30% du réseau (vulpin, ray-grass, brome sp. et pâturin sp.)

Nous verrons à partir du prochain bulletin la répartition de la flore dicotylédone observée **avec une clé d'entrée désherbage automnal ou non**.





9 février 2026

Régions BFC & Lorraine #1



CONDITIONS D'APPLICATION DES HERBICIDES (SOURCE ARVALIS)

	Au moment du traitement			Jours avant et après le trait. (entre J-2 et J+3)				Après le trait.	
				Stade des adventices <3fe. pl. dév.	T° moy.	T° mini < -2°C	Amplitude thermique > 15°C (+ T min < 0°C)	Déficit hydrique	Pluie
Herbicides racinaires	< 19 km/h	> 0°C < 25°C	> 60%		> 0°C				
Herbicides foliaires de contact		> 5°C < 25°C			> 5°C				
Hormones		> 10 à 12 < 25°C			> 10°C				
Autres herb. foliaires systémiques		> 5 à 7 < 25°C			> 5°C				

Sél : Sélectivité
Eff : Efficacité

¹Risque de mauvaise sélectivité en sols filtrants et fortes précipitations

²Délai à la pluie variable selon les produits et leur formation



Pas d'effets



Effets moyennement défavorables



Effets défavorables



Effets favorables



BOTA'CLUB : NUISIBILITÉ DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8
Folle avoine	5.3
Coquelicot	22
Matricaire	22
Ray-Grass	25
Vulpin	26
Stellaire	26

Véronique de Perse	26
Véronique F de L	44
Lamier	44
Myosotis	66
Pensée	133
Alchémille	133

Le coup
de pouce



FlashFlore

Outil de reconnaissance
des adventices

