



23 février 2026

Régions BFC & Lorraine #2



ETAT DE L'OBSERVATION DES DICOTYLÉDONES DANS LE RÉSEAU


Observez-vous des dicotylédones dans votre blé tendre d'hiver ?

Stade moyen du blé : début tallage



OUI

NON



60 % de ces situations ont été désherbées à l'automne (post-semis prélevée ou post levée à base de prosulfocarbe, flufénacet, aclonifen, pendiméthaline, diflufénicanil, chlortoluron)


75 % de ces situations ont été désherbées à l'automne (post-semis prélevée et/ou post levée à base de prosulfocarbe, flufénacet, aclonifen, diflufénicanil)

Une large majorité (71%) des agriculteurs du réseau observe des dicotylédones au 23 février (rappel : 57% le 9 février), en comprenant presque 2/3 des situations qui ont pourtant déjà été désherbées à l'automne. Il s'agit donc ici des situations où les herbicides employés commencent à révéler les « trous » d'efficacité...

... Alors qu'une minorité (29%) d'agriculteurs du réseau n'observe pas de dicotylédones : ils sont pour la plupart intervenus avec un passage herbicide automnal, traduisant de très bonnes efficacités à date...



QUELLE FLORE PRÉSENTE DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



Gaillet gratteron
Véroniques
Matricaires

Vulpin des champs
Ray-grass sp.
Pâturin sp.

% de parcelles avec présence



Désherbée à l'automne



Non désherbée à l'automne



À RETENIR

François COCHET – Resp. tech. de région - 06 89 18 96 82



La flore dicotylédone est variée avec un trio de tête inchangé par rapport au bulletin précédent (gaillet gratteron, véroniques et matricaires) tandis que l'ensemble des vulpins présents s'explique par le choix d'impasse herbicide à l'automne par les agriculteurs concernés. Contrairement à eux, les ray-grass présents ont échappé au programme appliqué au champ.

La période de désherbage de sortie d'hiver va pouvoir commencer dès que les sols seront réessuyés après cette fin d'hiver marquée par des conditions climatiques compliquées. Nos herbicides anti-dicotylédones à large spectre sont particulièrement adaptés avec les rattrapages anti-graminées de sortie d'hiver.



23 février 2026

Régions BFC & Lorraine #2




BÉNÉFICES DE LA FORMULATIONS SX®

BÉNÉFICES DE LA FORMULATION SX®

- > Mesure facile et formulation stable
- > Solubilisation dans l'eau accrue
- > Plus rapide, plus d'activité
- > Rinçage pulvérisateur simplifié
- > Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau :



BOTA'CLUB : VÉRONIQUE À FEUILLES DE LIERRE | VÉRONIQUE DE PERSE

Véronique à feuilles de lierre

Cotylédons

Grands, ovales, à sommet arrondi, pétioles et non échancrés.



Feuilles

Limbe de la première paire de feuilles présente 3 lobes marqués. Les suivantes sont divisées en 3 à 5 lobes.



Véronique de Perse

Cotylédons

Taille moyenne, forme triangulaire-arrondie, pétioles et légèrement tronqués au sommet.



Feuilles

Premières feuilles opposées, les suivantes alternes. Feuilles ovales larges à grosses dents : entre 5 à 9 dents pour les feuilles adultes.



Le coup de pouce



FlashFlore

Outil de reconnaissance des adventices

