

Bulletin OBSHERB #6 Centre

A RETENIR

Le Top Traitement chardon des champs est atteint.

Les interventions dans les parcelles avec chardons des champs peuvent être déclenchées.

Vigilance du respect du stade maximum homologué de notre gamme, c'est-à-dire BBCH 39 (précisions au verso). Pensez à **adapter le choix du produit en fonction de la flore secondaire.**


LA FLORE DU RÉSEAU OBS'HERB

Focus Chardon des Champs: dynamique de levée


Plateau de levée atteint pour la majorité des parcelles. **Les interventions peuvent être réalisées** dans les parcelles concernées par la présence de chardon des champs.

Observer à la parcelle le stade de la culture afin de **respecter le stade maximum** d'utilisation des produits, BBCH 39; limbe de dernière feuille étalée, ligule juste visible.

Suivi dynamique de levée chardon Centre 2022



Flore présente en % de citation



Situations désherbées à l'automne

On constate **peu de nouvelle levée d'adventices** (mouron rouge et éthuse).

70% des parcelles avec chardons ont aussi **une flore secondaire** d'identifiée (renouée liseron, renouée des oiseaux, gaillet).

Il est important **d'observer la flore** de ses parcelles afin de choisir le produit avec le **spectre le plus adapté.**

Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Avant toute utilisation, assurez-vous que celle-ci est indispensable. Privilégiez chaque fois que possible les méthodes alternatives et les produits présentant le risque le plus faible pour la santé humaine et animale et pour l'environnement, conformément aux principes de la protection intégrée. Consultez <http://agriculture.gouv.fr/ecophyto>.

PRODUITS POUR LES PROFESSIONNELS : UTILISEZ LES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES AVEC PRÉCAUTION. AVANT TOUTE UTILISATION, LISEZ L'ÉTIQUETTE ET LES INFORMATIONS CONCERNANT LE PRODUIT.



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible




ObsHerb #6

SECURISER LES UTILISATIONS JUSQU'AU STADE BBCH 39 – DFE

Notre gamme anti-dicotylédone **SX®** et **LQM®** de printemps est sélective et homologuée jusqu'à BBCH39 «Limbe de dernière feuille étalée, ligule juste visible» (voir infographie ci-contre).

SÉCURISER LES UTILISATIONS

- ✓ Le stade **BBCH39** est à apprécier à la parcelle et non pas globalement à l'ensemble des variétés.
- ✓ Si une association fongicide est nécessaire à ce stade, mesurer les risque liés aux conditions froides après l'application. Ne pas traiter
 - si T°C < 5°C dans les 4 jours après l'application
 - ou si amplitude < 13°C susceptible de persister
 - et avec des températures comprises entre 10°C et 25°C.



BOTA'CLUB : NUISIBILITÉ DES ADVENTICES

Nuisibilité directe de quelques adventices : **Nombre de pieds suffisants au m² pour faire chuter le rendement de 5 % des céréales à paille** (Source : ARVALIS - Institut du végétal, Wilson, HGCA, ACTA, ...)

Gaillet	1.8	Véronique de Perse	26.0
Folle avoine	5.3	Véronique F de L	44.0
Coquelicot	22.0	Lamier	44.0
Matricaire	22.0	Myosotis	66.0
Ray-Grass	25.0	Pensée	133.0
Vulpin	26.0	Alchémille	133.0
Stellaire	26.0		



Evalio® FlashFlore
Outil de reconnaissance des adventices



Evalio® HerbiXpert
La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

