


ObsHerb N°1 - Bretagne

16 Février 2022

LE RÉSEAU RÉGIONAL BRETAGNE



L'observatoire régional montre 55% des parcelles désherbées à l'automne et 45% encore non désherbées




Parcelles non désherbées à l'automne



Parcelles désherbées à l'automne

QUELLES PRATIQUES DE DÉSHERBAGE SUR LE RÉSEAU RÉGIONAL ?

Total situations Bretagne



ET PAR RAPPORT AU NIVEAU NATIONAL ?



Conditions propices aux semis de céréales d'hiver en 2021 :

6,75 millions ha

Stable vs 2020
(source Agreste)

68% traités automne

hectares France traités automne 2021
(source ADquation)




Augmentation structurelle des applications d'automne



Taux de traitement automne VS hectares semés - Panel Adquation - Février 2022

QUELLE FLORE DICOTS DANS LES PARCELLES DU RÉSEAU ?



En tête du classement des dicots les plus retrouvées se trouve la plus préjudiciable : le **gaillet (14%)**. Suivent des adventices courantes en Bretagne: les véroniques, la stellaire, la fumeterre, le séneçon, la pensée et les vivaces etc.

ObsHerb N°1- Bretagne


16 février 2022

EXPERTISES DESHERBAGE FMC

Composition des SX®:

- Mesure facile et formulation stable
- Solubilisation dans l'eau accrue
- Plus rapide, plus d'activité
- Rinçage pulvérisateur simplifié
- Utilisable à partir de 50 l/ha de bouillie

SX® complètement soluble dans l'eau:



BOTA'CLUB : LE GAILLET GRATTERON

Famille	Rubiacées											
Type	<input checked="" type="radio"/> Annuelle	<input type="radio"/> Bisannuelle	<input type="radio"/> Pluriannuelle	<input type="radio"/> Vivace								
Période de germination	<input checked="" type="radio"/> J	<input type="radio"/> F	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> A	<input type="radio"/> M	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> J	<input type="radio"/> A	<input checked="" type="radio"/> S	<input type="radio"/> O	<input type="radio"/> N	<input type="radio"/> D
Résistance en FR	<input type="radio"/> Oui	<input checked="" type="radio"/> Non										
Nuisibilité	<input checked="" type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input type="radio"/> Faible	<input type="radio"/> Inconnue								
Toxicité	<input type="radio"/> Forte	<input type="radio"/> Moyenne	<input checked="" type="radio"/> Nulle	<input type="radio"/> Inconnue								



A RETENIR



N. Scipion
RTM Bretagne et
Basse Normandie

« La structure du désherbage des céréales évolue en Bretagne. L'automne s'ancre dans les pratiques un peu plus chaque campagne, amenant une approche différente dans la construction du programme herbicide, notamment dans la gestion des dicots.

A l'échelle du **réseau régional ObsHerb**, cela se traduit par **55% des parcelles désherbées à l'automne**. Les **conditions d'application** ont été **favorables**, permettant globalement de **bonnes efficacités**. Cependant, il est à noter que **dans 63% des parcelles désherbées à l'automne, la présence de dicots est relevée**, avec en tête de liste, la plus préjudiciable au rendement : le gaillet ($1,8/m^2 = 5\%$ de perte), ainsi que du rumex.

Le suivi du réseau au cours des prochaines semaines permettra d'observer l'évolution de la flore dicots dans ces parcelles»



Evalio® **FlashFlore**
Outil de reconnaissance
des adventices



Evalio® **HerbiXpert**
La bonne dose, au bon moment,
sur la bonne cible

