

ObsHerb N°2- Bretagne


LES INFOS DU RÉSEAU RÉGIONAL BRETAGNE

Dans les parcelles désherbées à l'automne



75% présentent encore des dicots

QUELLE FLORE DICOTS PRÉSENTE APRÈS UN DÉSHERBAGE AUTOMNE?





N. Scipion RTM Bretagne et Basse Normandie

Les parcelles désherbées à l'automne commencent à montrer des relevées de dicots.

Hormis les plus fréquentes citées ci-dessus, nous retrouvons Le lamier, L'anthrisque et la carotte sauvage ainsi que les vivaces (Lychnis dioïque, chardon et laiteron)



ObsHerb N°2- Bretagne 28 février 2022

EXPERTISES DESHERBAGE FMC

DIFFERENTS TYPES DE RESISTANCE


Résistance liée à la cible (RLC) *Mutation de cible*



Au champ:

- · Absence totale d'efficacité
- Pas d'effet dose
- Tous les herbicides à mode d'action identique sont inefficaces (herbicides qui se fixe sur la même cible)
- Semble plus fréquente chez les dicotylédones

Résistance Non liée à la cible (RNLC) **Détoxification** (métabolisation, isolation...)



Au champ:

- Symptômes plus ou moins forts et passagers
- Effet dose possible
- Résistance croisée possible
- Sensibilité différente entre matière active du même groupe (facteur de résistance variable – faible à forte)

Ces 2 mécanismes peuvent coexister dans la même parcelle voire même dans la même plante

BOTA'CLUB: ANTHRISQUE COMMUN

Famille	Apiacées		
Туре	Annuelle	■ Bisannuelle ■ Pluriannuelle ■ Vivace	
Période de germination	• J • F • M	OA OM OJ OJ OA OS OO ON OD	
Résistance _{en FR}	Oui	Non	
Nuisibilité	Forte	■ Moyenne FaibleInconnue	
Toxicité	Forte	■ Moyenne ■ Faible■ Inconnue	
Confusion		Autres apiacées et fumeterres	







Evalio[®] **HerbiXpert**La bonne dose, au bon moment, sur la bonne cible

